

けが



頭を打った

次の症状はみられますか？

- 打った部分がへこんでいる
- 意識がない
- 出血が止まらない
- けいれんがある
- 何回も吐く

ひとつでも
あてはまる

救急車を呼ぶ！

119番

あてはまるものがない

次の症状はみられますか？

- すぐに泣かずに、泣くまで数十秒かかった
- 顔色が悪く、吐いたり吐き気がある
- 大人の親指以上のたんこぶがある
- プヨプヨとはれてきた
- 眼の動き（目つき）に異常がある

ひとつでも
あてはまる

すぐに医療機関を受診！

あてはまるものがない

様子をみながら、
通常の診療時間内に受診

症状が大きく変わったら

家庭での対応

- ✦ 出血した場合は乾いたタオルで強く圧迫
- ✦ 体をゆすったり、たたいたりしないように
- ✦ すぐに泣いて、他の症状がないときでも数時間は安静に
- ✦ 吐き気の有無、瞳の大きさ、目や手足の動きに注意



だっ きゅう

脱臼

関節が外れた状態を脱臼といい、関節がずれた状態を亜脱臼といいます。赤ちゃんの手を急に引っ張ったり、両手でぶら下がり遊んでいるときに、肩・ひじ・指に起こりやすいけがです。

次の症状はみられますか？

- 関節がはれて、変形している
- おもちゃやスプーンを持ってない
- バンザイができない

ひとつでもあてはまる

すぐに医療機関を受診！



家庭での対応

- ✦脱臼をはめたり、関節の変形を治したりしない
- ✦はれている場合は冷やす
- ✦上肢ならば三角巾で固定



はな ち

鼻血

赤ちゃんやこどもは、よく鼻血を出します。鼻に指を入れたりして、粘膜が傷ついて出血するのが原因です。ほとんどがすぐに止まり、心配はいりません。

家庭での対応

- ✦眉間を冷やす
- ✦止まりにくいときはガーゼを詰める
- ✦止血してもすぐに鼻をかまない
- ✦鼻血を飲みこまないよう、頭を高くして、軽くおじぎをするような格好をとらせる

